


用纳洛酮扭转服用阿片类药物过量的症状

1

检查

检查这位人士的呼吸并且试着叫醒他或她。



2

打电话

打 911。



3

呼吸

用胸外按压来帮助呼吸 (无论是否做人工呼吸)。



4

喷药

如果没有反应, 给他或她纳洛酮。
请看背面每一种纳洛酮给药器具的具体使用说明。

5


留下

继续进行胸外按压, 直到这位人士可自行进行呼吸为止。让这位人士侧躺, 并且留在他或她身边, 直到救援到来为止。





在 **ReverseOverdose.org** 网站上下载培训工具, 并且了解更多信息

鼻喷剂使用说明





1. 把大拇指抵在柱塞底部, 两个手指扣住喷嘴。
用力把药喷入鼻孔。*

鼻内喷剂使用说明




1. 把注射器上下的盖子都拉掉或撬开。
2. 把白色椎体拧到注射器的针筒顶部。



3. 把纳洛酮胶囊的盖子撬开。
4. 将纳洛酮药筒拧到针筒上。

5. 把白色椎体插入鼻孔。快速用力推动纳洛酮药筒底部。给每个鼻孔纳洛酮药筒中一半的药物。*



*可以每过 2-3 分钟给予更多剂量, 直到这位人士有反应为止。
继续进行胸外按压, 直到这位人士可自行进行呼吸为止。