


Преодоление налоксоном передозировки опиоидами

1

ПРОВЕРКА

Проверьте дыхание пострадавшего и попытайтесь привести его в чувство



2

ВЫЗОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

Позвоните по телефону 911.



3

ДЫХАНИЕ

Поддерживайте дыхание пострадавшего, нажимая на его грудь (применяя или не применяя искусственное дыхание).



4

ВПРЫСК ПРЕПАРАТА

Если пострадавший не реагирует, примените налоксон. **См. на обороте подробные инструкции по применению налоксона устройством того или иного типа.**

5


ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Продолжайте часто нажимать на грудь пострадавшего, пока он не начнет дышать самостоятельно. Поверните пострадавшего набок и оставайтесь с ним до прибытия скорой помощи.





Загрузить «Средства обучения» (Training Tools) и получить дальнейшие сведения можно, посетив сайт **ReverseOverdose.org**

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ





1. Удерживайте устройство большим пальцем с нижней стороны поршня и двумя другими пальцами вокруг наконечника.*

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ



1. Отделите верхнюю и нижнюю крышечки шприца.


2. Навинтите белый конус сверху цилиндра шприца.



3. Отделите крышечку капсулы с налоксоном.

4. Ввинтите капсулу с налоксоном в цилиндр шприца.

5. Вставьте белый конус в ноздрю пострадавшего. Нажмите быстрым движением на конец капсулы с налоксоном. Половина содержимого капсулы впрыскивается в каждую из ноздрей.*



*Дополнительные дозы можно впрыскивать каждые 2-3 минуты до тех пор, пока пострадавший не отреагирует.